治療スケジュール

A-14

*レジメン名	CBDCA+PTX+BV療法(21日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	パクリタキセル200mg/㎡ d1、カルボプラチンAUC6 d1、ベバシズマブ15mg/kg d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
		ポララミン注	5	mg		○							
		ファモチジン注	20	mg		○							
		グラニセトロン注	1	mg		○							
		デキサート注	4.95	mg		○							
		アロカリス点滴静注	1	V		○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	3時間	○							
	☆	パクリタキセル注	200	mg/㎡		○							
		0.22μmフィルター使用											
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○							
	☆	カルボプラチン注	6	AUC		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	90分	○							
	☆	ベバシズマブBS点滴静注	15	mg/kg		○							
		1日1回											
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可											
		それ以降、30分投与とすることができる											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		休薬完了					●						