

治療スケジュール

A-31

*レジメン名	CBDCA+nab-PTX+ペムプロリスマブ療法(21日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	ペムプロリスマブ 200mg/body d1、パクリタキセル(アルブミン懸濁型) 100mg/m ² d1,8,15、カルボプラチン AUC=6 d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・*コメント・*休業完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(21)	d()	d()	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回	50	mL	15分	○							
通常点滴注射 メインルート	☆	キイトルーダ注 0.2-5μmのインラインフィルターを使用 1日1回 無菌製剤処理料1	50 200	mL mg/body	30分	○ ○							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回 流し 投与終了後、インラインフィルターなしルートに変更	50	mL	15分	○							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 グラニセトロン注 アロカリス点滴静注235mg デキサート注 1日1回	100 1 1 4.95	mL mg V mg	30分	○ ○ ○ ○							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 デキサート注 1日1回	50 6.6	mL mg	15分		○ ○	○ ○					
通常点滴注射 メインルート	☆	生理食塩液 アブラキサン注 1日1回 インラインフィルターは使用しないこと 無菌製剤処理料1	100 100	mL mg/m ²	30分	○ ○	○ ○	○ ○					
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回	50	mL	15分	○							
通常点滴注射 メインルート	☆	生理食塩液 カルボプラチン注 1日1回 無菌製剤処理料1	250 6	mL AUC	1時間	○ ○							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回 流し 休業完了	50	mL	15分	○	○	○					