

治療スケジュール

*レジメン名	PEM+ペムブロリズマブ療法(21日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	ペムブロリズマブ200mg d1、ペメトレキセド500mg/m ² d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()	d()	d()	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 1日1回 ルート確保	50	mL	15分	○							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 ☆ キイトルーダ注 1日1回 0.2-5μmのインラインフィルターを使用 無菌製剤処理料1	100 200	mL mg/body	30分	○ ○ ○							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 デキサート注射液 1日1回	50 6.6	mL mg	15分	○ ○							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 ☆ アリムタ注射用 1日1回 無菌製剤処理料1	100 500	mL mg/m ²	10分	○ ○							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 1日1回 流し 休薬完了	50	mL	15分	○					●		
		以下別オーダー											
筋肉内注射		シアノコバラミン注1000μg 1日1回	1	A	9週間ごと								
					アリムタ初回投与の少なくとも7日前に筋肉内注射。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に投与。								
内服		調剤用パンビタン末 1日1回 (葉酸として0.5mg)	1	g	連日								
					アリムタ初回投与の7日以上前から連日経口投与。アリムタを中止又は終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り投与。								