治療スケジュール

A-49

*レジメン名	CDDP+ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+ﾈｼﾂﾑﾏﾌﾞ療法(21日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	シスプラチン 75mg/㎡ day1, ゲムシタビン 1250mg/㎡ day1,8, ネシツムマブ 800mg/body day1,8

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(8)	d(21)	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○						
		デキサート注	9.9	mg		○						
		パロノセトロン注	0.75	mg		○						
		アロカリス点滴静注235mg	1	V								
		1日1回										
		メイン①										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分					○		
		デキサート注	6.6	mg						○		
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	200	mL	1時間	○				○		
	☆	ポートラーザ注	800	mg/body		○				○		
		1日1回										
		生理食塩液250mLから50mL抜き200mLとして使用										
		調製後4時間以内に投与を開始すること										
		無菌製剤処理料1										
		メイン②(day1)										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○				○		
		1日1回										
		メイン③										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○				○		
	☆	ゲムシタビン注	1250	mg/㎡		○				○		
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
		メイン④(day1)										
通常点滴注射　メインルート		20%マンニットール注	300	mL	30分	○						
		1日1回										
		メイン⑤										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○						
	☆	シスプラチン注	75	mg/㎡		○						
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
		メイン⑥										
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○						
		Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq	1	A		○						
		硫酸Mg補正液20mEq/20mL	0.4	A		○						
		1日1回										
		側管⑥　シスプラチンと同時投与										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○						
		Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq	1	A		○						
		1日1回										
		メイン⑦										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分					○		
		1日1回										
		休薬完了									●	
		以下別オーダー										
内服		オランザピン錠	5	mg	d1-4	○	○	○	○			
		1日1回眠前										
内服		デカドロン錠	8	mg	d2-4		○	○	○			
		1日2回朝昼食後										