治療スケジュール

A-51

*レジメン名	CBDCA+PEM+ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ療法(42日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	ニボルマブ(オプジーボ)360mg/body d1・22、イピリムマブ(ヤーボイ)1mg/kg d1、ペメトレキセド(アリムタ)500mg/㎡ d1・22、カルボプラチンAUC6 d1・22

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(22)	d(42)	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○					
		1日1回										
		ルート確保										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○					
	☆	オプジーボ注	360	mg/body		○	○					
		1日1回										
		30kg未満の場合は、生食100mLから36mL抜いて										
		オプジーボ36mLを注入し、総量100mLにする										
		0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○						
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	30	mL	30分	○						
	☆	ヤーボイ注	1	mg/kg		○						
		1日1回										
		生食50mLから20mL抜き、30mLとして使用										
		0.2-1.2μmのインラインフィルターを使用										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○					
		パロノセトロン注	0.75	mg		○	○					
		デキサート注	4.95	mg		○	○					
		アロカリス点滴静注235mg	1	V		○	○					
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	10分	○	○					
	☆	アリムタ注	500	mg/㎡		○	○					
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○					
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○	○					
	☆	カルボプラチン注	6	AUC		○	○					
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○					
		1日1回										
		流し										
		休薬完了						●				
		以下別オーダー										
筋肉内注射		シアノコバラミン注1000μg	1	A	9週間ごと							
		1日1回			アリムタ初回投与の少なくとも7日前に筋肉内注射。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に投与。							
内服		調剤用パンビタン末	1	g	連日							
		1日1回　(葉酸として0.5mg)			アリムタ初回投与の7日以上前から連日経口投与。アリムタを中止又は終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り投与。							