治療スケジュール

A-53

*レジメン名	CDDP+PEM+ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ療法(42日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	ニボルマブ(オプジーボ)360mg/body d1・22、イピリムマブ(ヤーボイ)1mg/kg d1、CDDP 75mg/㎡ d1・22、ペメトレキセド(アリムタ)500mg/㎡ d1・22

通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○						
		1日1回											
		ルート確保											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○						
	☆	オプジーボ注	360	mg/body		○	○						
		1日1回											
		30kg未満の場合は、生食100mLから36mL抜いて											
		オプジーボ36mLを注入し、総量100mLにする											
		0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	30	mL	30分	○							
	☆	ヤーボイ注	1	mg/kg		○							
		1日1回											
		生食50mLから20mL抜き、30mLとして使用											
		0.2-1.2μmのインラインフィルターを使用											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○						
		パロノセトロン注	0.75	mg		○	○						
		デキサート注	9.9	mg		○	○						
		アロカリス点滴静注235mg	1	V		○	○						
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	10分	○	○						
	☆	アリムタ注	500	mg/㎡		○	○						
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○	○						
		Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq	1	A		○	○						
		硫酸Mg補正液20mEq/20mL	0.4	A		○	○						
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○	○						
	☆	シスプラチン注	75	mg/㎡		○	○						
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		マンニットール注	300	mL	30分	○	○						
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○	○						
		Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq	1	A		○	○						
		1日1回											
		休薬完了						●					
		以下別オーダー											
筋肉内注射		シアノコバラミン注1000μg	1	A	9週間ごと								
		1日1回			アリムタ初回投与の少なくとも7日前に筋肉内注射。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に投与。								
内服		調剤用パンビタン末	1	g	連日								
		1日1回 （葉酸として0.5mg）			アリムタ初回投与の7日以上前から連日経口投与。アリムタを中止又は終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り投与。								
内服		オランザピン錠	5	mg	d1-4								
		1日1回 眠前											
内服		デカドロン錠	8	mg	d2-4								
		1日2回 朝昼食後											