治療スケジュール

A-54

*レジメン名	ニボルマブ+イピリムマブ療法(42日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	ニボルマブ(オプジーボ)360mg/body d1・22、イピリムマブ(ヤーボイ)1mg/kg d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(22)	d(42)	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○					
		1日1回										
		ルート確保										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○					
	☆	オプジーボ注	360	mg/body		○	○					
		1日1回										
		30kg未満の場合は、生食100mLから36mL抜いて										
		オプジーボ36mLを注入し、総量100mLにする										
		0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○						
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	30	mL	30分	○						
	☆	ヤーボイ注	1	mg/kg		○						
		1日1回										
		生食50mLから20mL抜き、30mLとして使用										
		0.2-1.2μmのインラインフィルターを使用										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○					
		1日1回										
		流し										
		休薬完了						●				