

治療スケジュール

B-1

*レジメン名	EC療法(21日間)(乳)
*投与量・投与日	エピルピシン90mg/m ² , エンドキサン600mg/m ² , d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○		
		デキサート注	9.9	mg		○		
		アロキシ注	0.75	mg		○		
		開始30分前にアプレピタント内服 1日1回						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○		
	☆	エピルピシン注	90	mg/m ²		○		
		1日1回 無菌製剤処理料1						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○		
		1日1回 流し						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○		
	☆	エンドキサン注	600	mg/m ²		○		
		1日1回 無菌製剤処理料1(揮発性)						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○		
		1日1回 休薬完了						●
		以下別オーダー						
内服		アプレピタントCap	125	mg	d1			
		1日1回 エピルピシン開始60分前						
内服		アプレピタントCap	80	mg	d2,3			
		1日1回 朝食後						
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	d2,3,4			
		1日2回 朝昼食後						