治療スケジュール

B-2

*レジメン名	TC(ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ)療法(21日間)(乳)
*投与量・投与日	ドセタキセル75mg/㎡ 点滴静注、シクロホスファミド600mg/㎡ 点滴静注

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		グラニセトロン静注液	1	mg		○							
		デキサート注射液	6.6	mg		○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		5%ブドウ糖注	250	mL	60分	○							
	☆	ドセタキセル点滴静注	75	mg/㎡		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		流し											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
	☆	注射用エンドキサン	600	mg/㎡		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1(揮発性)											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		流し											
		休薬完了					●						
		以下別オーダー											
内服		デカドロン錠(0.5m)g	16	錠	d2-4								
		1日2回　朝昼食後											