

治療スケジュール

B-12

*レジメン名	CMF療法(28日間)(乳)
*投与量・投与日	エンドキサン100mg/m ² 経口 d1~14、メトレキセート40mg/m ² d1,8、フルオロウラシル600mg/m ² d1,8

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(28)			
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分	○	○				
		デキサート注射液	6.6	mg		○	○				
		グラニセトン静注液	1	mg		○	○				
		1日1回									
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分	○	○				
	☆	メトレキセート注	40	mg/m ²		○	○				
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	5分	○	○				
	☆	フルオロウラシル注	600	mg/m ²		○	○				
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分	○	○				
		1日1回									
		流し									
		休薬完了								●	
		以下別オーダー									
内服	☆	シクロホスファミド	100	mg/m ²	d1-14						
内服		エリーテン(メクロプラミド)錠(5mg)	3~6	錠 分3	d1-14						