レジメン登録フォーマット

B-29

*レジメン名	3wDTx＋ﾌｪｽｺﾞ療法【初回】(皮下)(21日間)(乳
*投与量・投与日	ﾌｪｽｺﾞ配合皮下注IN 15mL day1、ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ 75mg/㎡ day1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )
皮下注射	☆	ﾌｪｽｺﾞ配合皮下注IN	15	mL	8分以上	○							
		大腿部に投与											
		調製後、4時間以内に投与完了すること。											
		投与後観察時間30分											
		無菌製剤処理料1											
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
		デキサート注	6.6	mg		○							
		フェスゴ投与後の観察時間終了後に投与を開始											
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖液	250	mL	75分	○							
	☆	ドセタキセル	75	mg/㎡		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		流し											
		休薬完了					●						
		以下別オーダー											
内服		デカドロン錠	8	mg	d2,3								
		1日2回 朝昼食後											