治療スケジュール

C-1

*レジメン名	PF療法(28日間)(頭頸部)
*投与量・投与日	CDDP 80mg/㎡ d1、　5FU 800mg/㎡/日 d1～5

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(5)	d(28)	d( )	d( )	d( )	d( )
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	60分	○									
		デキサート注射液	9.9	mg		○									
		グラニセトロン注	1	A		○									
		1日1回													
		点滴開始時にアプレピタントカプセル125mg内服													
		側管2													
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○	○						
		デキサート注射液	6.6	mg			○	○	○						
		1日1回													
		側管2													
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○									
	☆	シスプラチン注	80	mg/㎡		○									
		1日1回													
		メイン止めて													
		側管2													
		無菌製剤処理料1													
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○									
		フロセミド注	0.5	A		○									
		1日1回													
		側管2													
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	5日間 2mL/h	○									
	☆	フルオロウラシル注	4000	mg/㎡		○									
		1日1回													
		全量240mLに。(Infusor LV2)													
		側管1													
		無菌製剤処理料1													
		携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用)													
		休薬完了									●				
		以下別オーダー													
通常点滴注射 メインルート		(ハイドレーション)													
内服		アプレピタントカプセル	125	mg	day1										
		1日1回 朝													
		デキサート点滴開始時													
内服		アプレピタントカプセル	80	mg	day2.3										
		1日1回 朝食後													
内服		ロラゼパム錠(0.5mg)													