治療スケジュール

D-2

*レジメン名	FP + 放射線療法(56日間)(食道)
*投与量・投与日	CDDP70mg/㎡ d1、29　5FU700mg/㎡/日 d1～4 、d29～32　RT 2Gy/d、total 60Gy

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(29)	d(30)	d(31)	d(32)	d(56)
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	90分	○				○				
		デキサート注射液	9.9	mg		○				○				
		グラニセトロン注	1	A		○				○				
		1日1回												
		点滴開始時にアプレピタントカプセル125mg内服												
		側管2												
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○	○		○	○	○	
		デキサート注射液	6.6	mg			○	○	○		○	○	○	
		1日1回												
		側管2												
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○				○				
	☆	シスプラチン注	70	mg/㎡		○				○				
		1日1回												
		側管2												
		メイン止めて												
		無菌製剤処理料1												
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○				○				
		フロセミド注	0.5	A		○				○				
		1日1回												
		側管2												
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	4日間 2mL/h	○				○				
	☆	フルオロウラシル注	2800	mg/㎡		○				○				
		1日1回												
		側管1												
		全量192mLに。(Infusor LV2)												
		無菌製剤処理料1												
		携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用)												
		休薬完了												●
		以下別処方												
通常点滴注射 メインルート		(ハイドレーション)												
内服		アプレピタントカプセル	125	mg	day1.29									
		1日1回 朝												
		デキサート点滴開始時												
内服		アプレピタントカプセル	80	mg	day2.3.30.31									
		1日1回 朝食後												
内服		ロラゼパム錠(0.5mg)												