

# 治療スケジュール

D-8

*レジメン名	ニボルマブ+イピリムマブ療法(42日間)(食道)
*投与量・投与日	ニボルマブ(オプジーボ)360mg/body d1・22、イピリムマブ(ヤーボイ)1mg/kg d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(22)	d(42)	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 1日1回 ルート確保	50	mL	15分	○	○					
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 ☆ オプジーボ注 1日1回 30kg未満の場合は、生食100mLから36mL抜いて オプジーボ36mLを注入し、総量100mLにする 0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用 無菌製剤処理料1	100 360	mL mg/body	30分	○ ○	○ ○					
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 1日1回	50	mL	15分	○						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 ☆ ヤーボイ注 1日1回 生食50mLから20mL抜き、30mLとして使用 0.2-1.2μmのインラインフィルターを使用 無菌製剤処理料1	30 1	mL mg/kg	30分	○ ○						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 1日1回 流し  休薬完了	50	mL	15分	○	○					●