レジメン登録フォーマット

D-9

*レジメン名	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+FP療法(28日間)(食道)
*投与量・投与日	ニボルマブ 240mg/body d1・15、CDDP80mg/㎡ d1、5FU 800mg/㎡/日 d1～5

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(5)	d(15)	d(28)	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		ハイドレーション用輸液は別オーダ														
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○					○					
		1日1回														
		プライミング用														
		点滴開始時にｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ125mg内服(day1のみ)														
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○					○					
	☆	オプジーボ注	240	mg/body		○					○					
		1日1回														
		メイン止めて														
		30kg未満の場合は、生食100mLから24mL抜いて														
		オプジーボ24mLを注入し、総量100mLにする														
		0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用														
		無菌製剤処理料1														
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○					○					
		1日1回														
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	30分	○										
		デキサート注射液	9.9	mg		○										
		グラニセトロン注	1	A		○										
		1日1回														
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○	○							
		デキサート注射液	6.6	mg			○	○	○							
		1日1回														
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○										
	☆	シスプラチン注	80	mg/㎡		○										
		1日1回														
		メイン止めて														
		無菌製剤処理料1														
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○										
		フロセミド注	0.5	A		○										
		1日1回														
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	250	mL	5日間　2mL/h	○										
	☆	フルオロウラシル注	4000	mg/㎡		○										
		1日1回														
		全量240mLに。(Infusor　LV2)														
		無菌製剤処理料1														
		携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用)														
		休薬完了										●				
		以下別オーダー														
通常点滴注射　メインルート		(ハイドレーション)														
内服		アプレピタントカプセル	125	mg	day1											
		1日1回　朝														
		シスプラチン開始60～90分前														
内服		アプレピタントカプセル	80	mg	day2・3											
		1日1回　朝食後														