

治療スケジュール

*レジメン名	トラスツズマブ+XP療法【初回】(21日間)(胃)
*投与量・投与日	トラスツズマブ 8mg/kg d1 シスプラチン 80mg/m <sup>2</sup> d1 ゼローダ 2000mg/m <sup>2</sup> d1夕 ~ d15朝

*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(21)	d( )	d( )
持続点滴注射	メインルート	ソルデム1輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○						
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 ☆トラスツズマブBS注 1日1回 側管 無菌製剤処理料1	250	mL	90分	○						
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 デキサート注射液 グラニセロン注 1日1回 開始時アプレピタントカプセル服用 側管	250 9.9 1	mL mg A	60分	○ ○ ○						
持続点滴注射	メインルート	ソルデム1輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○	○	○				
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 デキサート注射液 1日1回 朝 側管	50 6.6	mL mg	15分		○ ○	○ ○	○ ○			
側管点滴注射	メインルート	マンニトール注 1日1回 側管 メインを止めて点滴	300	mL	30分	○						
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 ☆シスプラチン点滴静注 1日1回 側管 無菌製剤処理料1	500 80	mL mg/m <sup>2</sup>	2時間	○ ○						
持続点滴注射	メインルート	ソルデム3A輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○	○	○				
持続点滴注射	メインルート	ソルデム1輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○	○	○				
持続点滴注射	メインルート	ソルデム3A輸液 1日1回 メイン  休薬完了	500	mL	6時間		○	○				●
以下別オーダー												
内服	☆	ゼローダ錠 1日2回 朝夕食後	2000	mg/m <sup>2</sup>	d1夕 ~ d15朝							
内服		アプレピタントカプセル 1日1回 3本目の点滴開始時	125	mg	d1							
内服		アプレピタントカプセル 1日1回 朝食後	80	mg	d2,3							
内服		ロラゼパム錠0.5mg	1	錠	d0眼前、d1朝							