

治療スケジュール

*レジメン名	トラスツマブ+XP療法【継続】(21日間)(胃)
*投与量・投与日	ハーセプチン 6mg/kg d1 シスプラチン 80mg/m ² d1 ゼローダ 2000mg/m ² d1夕 ~ d15朝

*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(21)	d()	d()
持続点滴注射	メインルート	ソルデム1輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○						
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 ☆トラスツマブBS注 1日1回 忍容性良好であれば30分まで短縮可 側管 無菌製剤処理料1	250	mL	90分	○	○					
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 デキサート注射液 グラニセトロン注 1日1回 開始時アプレビタントカプセル服用 側管	250	mL	60分	○	○	○				
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 デキサート注射液 1日1回 朝 側管	50	mL	15分		○	○	○			
側管点滴注射	メインルート	マンニトール注 1日1回 側管 メインを止めて点滴	300	mL	30分	○						
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 ☆シスプラチン点滴静注 1日1回 側管 無菌製剤処理料1	500	mL	2時間	○	○					
持続点滴注射	メインルート	ソルデム3A輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○	○	○				
持続点滴注射	メインルート	ソルデム1輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○	○	○				
持続点滴注射	メインルート	ソルデム3A輸液 1日1回 メイン 休薬完了	500	mL	6時間		○	○				●
以下別オーダー												
内服	☆	ゼローダ錠 1日2回 朝夕食後	2000	mg/m ²	d1夕~d15朝							
内服		アプレビタントカプセル 1日1回 3本目の点滴開始時	125	mg	d1							
内服		アプレビタントカプセル 1日1回 朝食後	80	mg	d2,3							
内服		ロラゼパム錠0.5mg	1	錠	d0眠前、d1朝							