

治療スケジュール

E-17

*レジメン名	XP 療法 (21日間)(胃)												
*投与量・投与日	CDDP 80mg/m ² d1 Capecitabine 2000mg/m ² d1ウ ~ d15アサ												
*手技	癌	*薬品名・*用法・*コメント・*休業完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(21)	d()	d()	
持続点滴注射	メインルート	ソルデム1輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○							
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 デキサート注射液 グラニセトン注 1日1回 開始時アプレピタントカプセル服用 側管	250 9.9 1	mL mg A	60分	○ ○ ○							
持続点滴注射	メインルート	ソルデム1輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○	○	○					
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 デキサート注射液 1日1回 朝 側管	50 6.6	mL mg	15分		○ ○	○ ○	○ ○				
側管点滴注射	メインルート	マンニトール注 1日1回 側管 メインを止めて点滴	300	mL	30分	○							
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 ☆ シスプラチン点滴静注 1日1回 側管 無菌製剤処理料1	500 80	mL mg/m ²	2時間	○ ○							
持続点滴注射	メインルート	ソルデム3A輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○	○	○					
持続点滴注射	メインルート	ソルデム1輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○	○	○					
持続点滴注射	メインルート	ソルデム3A輸液 1日1回 メイン 休業完了	500	mL	6時間		○	○				●	
以下別オーダー													
内服		☆ ゼローダ錠 1日2回 朝夕食後	2000	mg/m ²	d1夕~d15朝								
内服		アプレピタントカプセル 1日1回 2本目の点滴開始時	125	mg	d1								
内服		アプレピタントカプセル 1日1回 朝食後	80	mg	d2,3								
内服		ロラゼパム錠0.5mg	1	錠	d0眠前、d1朝								