

*レジメン名	ラムシルマブ+nab-PTX療法(28日間)(胃)	※全角25文字
*投与量・投与日	ラムシルマブ 8mg/kg(day1,15)、アブラキサン 100mg/m ² (day1,8,15)	

*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(28)	d()	d()	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分	○		○					
		デキサート注射液	6.6	mg		○		○					
		ポララミン注 5mg	1	A		○		○					
		1日1回											
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分		○						
		デキサート注射液	6.6	mg			○						
		1日1回											
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	全開	○		○					
		1日1回											
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	250	ml	60分	○		○					
	☆	サイラムザ	8	mg/kg		○		○					
		1日1回											
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より30分に短縮可											
		0.2μmインラインフィルター使用											
		infusion reaction G2以下:投与速度50%へ減量											
		infusion reaction G3以上:中止、かつ再投与なし											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分	○		○					
		1日1回											
		流し											
		投与終了後、インラインフィルターなしルートに変更											
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分	○		○					
		1日1回											
		プライミング用											
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	ml	30分	○	○	○					
	☆	アブラキサン	100	mg/m ²		○	○	○					
		1日1回											
		インラインフィルターは使用しないこと											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分	○	○	○					
		1日1回											
		流し											
		休薬完了							●				