治療スケジュール

F-10

*レジメン名	CPT-11+Cmab療法【初回】(14日間)(大腸)
*投与量・投与日	CPT－11　150mg/㎡　d1　、アービタックス　400mg/㎡　d1　250mg/㎡　d8

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(14)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		デキサート注	4.95	mg		○				
		ポララミン注	1	A		○				
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○			
		デキサート注	6.6	mg			○			
		ポララミン注	1	A			○			
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○			
		ファモチジン注	20	mg		○	○			
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○				
	☆	アービタックス注	400	mg/㎡		○				
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間		○			
	☆	アービタックス注	250	mg/㎡			○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	1時間	○				
		グラニセトロン注1mg	1	A		○				
		1日1回								
		点滴開始時アプレピタントカプセル服用								
		経過観察								
通常点滴注射　メインルート		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○				
	☆	イリノテカン注	150	mg/㎡		○				
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	25分	○				
		1日1回								
		流し								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	1時間		○			
		1日1回								
		経過観察　及び　流し								
		休薬完了						●		
		以下別オーダー								
内服		アプレピタントCap	125	mg	d1					
		1日1回　ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴開始時								
内服		アプレピタントCap	80	mg	d2,3					
		1日1回　朝食後								