治療スケジュール

F−14

*レジメン名	LV5FU(RPMI)療法(56日間)(大腸)
*投与量・投与日	5FU 600mg/㎡ ・レボホリナート250mg/㎡ d1、8、15、22、29、36

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(22)	d(29)	d(36)	d(56)	
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○	○	○		
		デキサート注射液	6.6	mg		○	○	○	○	○	○		
		1日1回											
		メイン											
側管点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○	○	○	○	○	○		
		レボホリナート点滴注	250	mg/㎡		○	○	○	○	○	○		
		1日1回											
		側管											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	5分	○	○	○	○	○	○		
	☆	フルオロウラシル注	600	mg/㎡		○	○	○	○	○	○		
		1日1回											
		I−LV開始1時間後、全開で点滴											
		メイン											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	25分	○	○	○	○	○	○		
		1日1回											
		メイン 流し											
		休薬完了										●	