治療スケジュール

F-21

*レジメン名	S-1+CPT-11(IRIS)療法(28日間)(大腸)
*投与量・投与日	CPT－11　125mg/㎡　d1、15　　S－1　80mg/㎡　d1～14

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(15)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○			
		デキサート注	4.95	mg		○	○			
		グラニセトロン注	1	A		○	○			
		1日1回								
		点滴開始1時間前にアプレピタントカプセル服用								
通常点滴注射　メインルート		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○	○			
	☆	イリノテカン注	125	mg/㎡		○	○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	25分	○	○			
		1日1回								
		流し								
		休薬完了						●		
		以下別オーダー								
内服	☆	S－1	80	mg/㎡	d1～14					
		1日2回　朝夕食後								
内服		アプレピタントCap	125	mg	day1・15					
		1日1回　1本目の点滴開始1時間前								
内服		アプレピタントCap	80	mg	day2・3・16・17					
		1日1回　朝食後								