

治療スケジュール

F-34

*レジメン名	BV+CAPIRI療法(21日間)(大腸)
*投与量・投与日	ベバシズマブ 7.5mg/kg d1、イリノテカン 200mg/m <sup>2</sup> d1、ゼローダ 1600mg/m <sup>2</sup> d1夕～d15朝

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		デキサート注	4.95	mg		○			
		グラニセトロン注	1	mg		○			
		1日1回							
		点滴開始時にアプレピタントカプセル服用							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	90分	○			
	☆	ベバシズマブBS点滴静注	7.5	mg/kg		○			
		1日1回							
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可							
		それ以降、30分投与とすることができる。							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		流し							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	2時間	○			
	☆	イリノテカン注	200	mg/m <sup>2</sup>		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		流し							
		休薬完了					●		
		以下別オーダー							
内服	☆	ゼローダ	1600	mg/m <sup>2</sup>	d1夕～d15朝				
		1日2回 朝夕食後							
内服		アプレピタントCap	125	mg	day1				
		1日1回 1本目の点滴開始時							
内服		アプレピタントCap	80	mg	day2,3				
		1日1回 朝食後							