治療スケジュール

F-38

*レジメン名	mFOLFOX6療法(14日間)(小腸)
*投与量・投与日	レボホリナート200mg/㎡ d1、 オキサリプラチン85mg/㎡ d1、 5Fu400mg/㎡ d1、 5Fu2400mg/㎡ d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(14)	d(14)	d( )	d( )
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生食注シリンジ	10	mL		○				
		1日1回								
		開始時 CVポートフラッシュ								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		デキサート注射液	6.6	mg		○				
		グラニセトロン静注液 1mg	1	A		○				
		1日1回								
		メイン①								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		ポララミン注 5mg/1mL	1	A		○				
		1日1回								
		メイン②								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○				
		レボホリナート点滴注	200	mg/㎡		○				
		1日1回								
		側管③								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○				
	☆	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/㎡		○				
		1日1回								
		メイン③ 側管③と併流								
		無菌製剤処理料1								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	5分	○				
	☆	フルオロウラシル注	400	mg/㎡		○				
		1日1回								
		メイン④								
		無菌製剤処理料1								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	100	mL	46時間 3.7mL/h	○				
	☆	フルオロウラシル注	2400	mg/㎡		○				
		1日1回								
		全量140mLに。(トレフューザー typeT)								
		メイン⑤								
		無菌製剤処理料1								
		携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用)								
		休薬完了					●			
		以下別オーダー								
内服		デカドロン錠	8	mg	day2・3					
		1日2回 朝昼食後								