

治療スケジュール

G-6

*レジメン名	ゲムシタビン+S-1療法(21日間)(胆道)
*投与量・投与日	ゲムシタビン1000mg/m ² d1・8 S-1 60mg/m ² (体表面積1.25m ² 未満:60mg(朝40mg・夕20mg)/day、1.25~1.5m ² 未満:80mg/day、1.5m ² 以上:100mg/day) d1~14

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○			
		デキサート注射液	6.6	mg		○	○			
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○			
	☆	ゲムシタビン注	1000	mg/m ²		○	○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○			
		1日1回								
		流し								
		休薬完了							●	
		以下別オーダー								
内服	☆	S-1	(60	mg/m ²)	day1~14					
		1日2回 朝夕食後								
		体表面積1.25m ² 未満	60	mg/day	(朝40mg・夕20mg)					
		体表面積1.25~1.5m ² 未満	80	mg/day						
		体表面積1.5m ² 以上	100	mg/day						