

治療スケジュール

G-7

*レジメン名	ゲムシタビン+CDDP+S-1療法(14日間)(胆道)
*投与量・投与日	CDDP 25mg/m ² d1、ゲムシタビン 1000mg/m ² d1、TS-1 40-60mgを1日2回 d1-7

*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(14)	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	250	mL	1時間	○			
		デキサート注射液	4.95	mg		○			
		グラニセトロン静注液 1mg	1	A		○			
		1日1回							
		点滴開始時にアプレピタントカプセル服用							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○			
	☆	ゲムシタビン注射用	1000	mg/m ²		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	500	mL	1時間	○			
	☆	シスプラチン注	25	mg/m ²		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	250	mL	1時間	○			
		1日1回							
		休薬完了						●	
		以下別オーダー							
内服		エスワンタイホウ	40-60	mg	day1-7				
		1日2回 朝夕食後							
内服		アプレピタントカプセル	125	mg	day1				
		1日1回 朝1本目の点滴開始時							
内服		アプレピタントカプセル	80	mg	day2・3				
		1日1回 朝食後							
内服		デカドロン錠(0.5mg)	8	錠	day2・3				
		1日2回 朝昼食後							