

# 治療スケジュール

G-9

*レジメン名	【術前】ゲムシタビン+S-1療法(21日間)(臍)
*投与量・投与日	ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup> d1・8、S-1 80mg/m <sup>2</sup> /日 d1~14

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(21)	d( )	d( )
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○	○			
		デキサート注	6.6	mg		○	○			
		1日1回								
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○	○			
	☆	ゲムシタビン注	1000	mg/m <sup>2</sup>		○	○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○	○			
		1日1回								
		流し								
		休薬完了							●	
		以下別オーダー								
内服	☆	S-1	40	mg/m <sup>2</sup> /回	day1~14					
		1日2回 朝夕食後								
		体表面積1.25m <sup>2</sup> 未満	40	mg/回						
		体表面積1.25~1.5m <sup>2</sup> 未満	50	mg/回						
		体表面積1.5m <sup>2</sup> 以上	60	mg/回						