治療スケジュール

H-6

*レジメン名	TP療法(21日間)(子宮頚)
*投与量・投与日	パクリタキセル 135mg/㎡ d1,　シスプラチン 50mg/㎡ d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(21)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート①		生理食塩水	50	mL	15分	○						
		デキサート注	9.9	mg		○						
		ファモチジン注	20	mg		○						
		1日1回										
		点滴開始時にレスタミンコーワ錠5錠内服										
通常点滴注射　メインルート②		生理食塩水	100	mL	30分	○						
		グラニセトロン 1mg	1	A		○						
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート③		生理食塩水	500	mL	3時間	○						
	☆	パクリタキセル	135	mg/㎡		○						
		1日1回										
		0.22μmフィルター使用										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート④		ソリューゲンF	500	mL	1時間	○	○					
		1日1回										
		点滴開始時にアプレピタントカプセル内服(day1)										
通常点滴注射　メインルート⑤		生理食塩水	500	mL	2時間	○						
	☆	シスプラチン	50	mg/㎡		○						
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート⑥		ソリューゲンF	500	mL	90分	○	○	○	○			
		L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸K点滴静注液　10mEq	1	A		○	○	○	○			
		フロセミド 20mg	1	A		○	○	○	○			
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート⑦		ソルデム3A	500	mL	90分	○	○	○	○			
		1日1回										
		休薬完了								●		
		以下別オーダー										
内服		レスタミン錠10mg	5	錠	day1							
		1日1回　1本目の点滴開始時										
内服		アプレピタントCap	125	mg	day1							
		1日1回　4本目の点滴開始時										
内服		アプレピタントCap	80	mg	day2・3							
		1日1回　朝食後										
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day2-4							
		1日2回　朝昼食後										