治療スケジュール

H-13

*レジメン名	dose-dense TC療法(21日間)(卵巣)
*投与量・投与日	パクリタキセル 80mg/㎡ d1, d8, d15、 カルボプラチン AUC 6 d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(21)	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	ml	15分	○	○	○			
		デキサート注射液	6.6	mg		○	○	○			
		ファモチジン注	20	mg		○	○	○			
		1日1回									
		点滴開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠5錠内服									
		メイン①									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	ml	30分	○	○	○			
		グラニセトロン静注液	1	mg		○	○	○			
		1日1回									
		メイン②									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	ml	90分	○	○	○			
	☆	パクリタキセル	80	mg/㎡		○	○	○			
		1日1回									
		メイン③									
		0.22μmフィルター使用									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		1日1回									
		メイン④									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	ml	2時間	○					
	☆	カルボプラチン	AUC=6			○					
		1日1回									
		メイン⑤									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	ml	15分	○					
		1日1回									
		流し									
		メイン⑥									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	ml	15分		○	○			
		1日1回									
		流し									
		メイン④									
		休薬完了							●		
		以下別オーダー									
内服		レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	d1.8.15						
		1日1回 1本目の点滴開始時									
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day2.3						
		1日2回 朝昼食後									