治療スケジュール

H-29

*レジメン名	TC+BV療法(21日間)(卵巣)
*投与量・投与日	パクリタキセル175mg/㎡　d1、カルボプラチンAUC5　d1、ベバシズマブ15mg/kg　d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(21)	d(　)	d(　)
通常点滴注射　メインルート①		生理食塩液	100	mL	15分	○					
		デキサート注	19.8	mg		○					
		ファモチジン注	20	mg		○					
		1日1回									
		点滴開始時にレスタミンコーワ錠5錠内服									
通常点滴注射　メインルート②		生理食塩液	50	mL	30分	○					
		グラニセトロン注	1	mg		○					
		1日1回									
通常点滴注射　メインルート③		生理食塩液	500	mL	3時間	○					
	☆	パクリタキセル注	175	mg/㎡		○					
		1日1回									
		0.22μmフィルター使用									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射　メインルート④		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		1日1回									
		流し									
通常点滴注射　メインルート⑤		生理食塩液	250	mL	1時間	○					
	☆	カルボプラチン注	5	AUC		○					
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射　メインルート⑥		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		1日1回									
通常点滴注射　メインルート⑦		生理食塩液	100	mL	90分	○					
	☆	ベバシズマブBS点滴静注	15	mg/kg		○					
		1日1回									
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可									
		それ以降、30分投与とすることができる									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射　メインルート⑧		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		1日1回									
		休薬完了							●		
		以下別オーダ									
内服		レスタミンコーワ錠　10mg	5	錠	d1　朝	○					
		1日1回　1本目の点滴開始時									
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	d2・3		○	○			
		1日2回　朝昼食後									