# 治療スケジュール

H-31

| | |
|---|---|
| *レジメン名 | TC+BV療法(21日間)(子宮頸がん) |
| *投与量・投与日 | パクリタキセル175mg/m2　d1、カルボプラチンAUC5　d1、アバスチン15mg/kg　d1 |

| *手技 | 癌 | *薬品名・*用法・コメント・*休薬完了 | *数量 | *単位 | 点滴時間・点滴速度 | d(1) | d(2) | d(3) | d(21) | d(　) | d(　) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常点滴注射　メインルート① | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | ○ | | | | | |
| | | デキサート注 | 19.8 | mg | | ○ | | | | | |
| | | ファモチジン注 | 20 | mg | | ○ | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | |
| | | 点滴開始時にレスタミンコーワ錠5錠内服 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射　メインルート② | | 生理食塩液 | 50 | mL | 30分 | ○ | | | | | |
| | | グラニセトロン注 | 1 | mg | | ○ | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射　メインルート③ | | 生理食塩液 | 500 | mL | 3時間 | ○ | | | | | |
| | ☆ | パクリタキセル注 | 175 | mg/㎡ | | ○ | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | |
| | | 0.22μmフィルター使用 | | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射　メインルート④ | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | ○ | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | |
| | | 流し | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射　メインルート⑤ | | 生理食塩液 | 250 | mL | 1時間 | ○ | | | | | |
| | ☆ | カルボプラチン注 | 5 | AUC | | ○ | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射　メインルート⑥ | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | ○ | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射　メインルート⑦ | | 生理食塩液 | 100 | mL | 90分 | ○ | | | | | |
| | ☆ | アバスチン注 | 15 | mg/kg | | ○ | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | |
| | | インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可 | | | | | | | | | |
| | | それ以降、30分投与とすることができる | | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射　メインルート⑧ | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | ○ | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 休薬完了 | | | | | | | ● | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **以下別オーダ** | | | | | | | | | |
| 内服 | | レスタミンコーワ錠　10mg | 5 | 錠 | d1　朝 | ○ | | | | | |
| | | 1日1回　1本目の点滴開始時 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 内服 | | デカドロン錠(0.5mg) | 16 | 錠 | d2･3 | | ○ | ○ | | | |
| | | 1日2回　朝昼食後 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |