治療スケジュール

H-38

*レジメン名	BV+ﾘﾎﾟ化ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ+CBDCA療法(28日間)(卵巣)
*投与量・投与日	ベバシズマブ10mg/kg d1・15、リポ化ドキソルビシン 30mg/㎡ d1、カルボプラチン AUC5 d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2-5)	d(15)	d(28)	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○		○		
		(day1)インラインフィルター無ルートを選択する								
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	90分	○		○		
	☆	ベバシズマブBS点滴静注	10	mg/kg		○		○		
		1日1回								
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可								
		それ以降、30分投与とすることができる								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○		○		
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖液	100	mL	30分	○				
		デキサート注	6.6	mg		○				
		グラニセトロン注	1	mg		○				
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖液	250	mL	2時間	○				
	☆	ドキシル注	30	mg/㎡		○				
		インラインフィルターは使用しない								
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖液	100	mL	30分	○				
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○				
	☆	カルボプラチン注	5	AUC		○				
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		1日1回								
		休薬完了							●	
		以下別オーダー								
内服		グラニセトロン内服ゼリー	2	mg	d2-5		○			
		1日1回 朝食後								