治療スケジュール

H-39

*レジメン名	TC+BV＋ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ療法(21日間)(子宮頸)
*投与量・投与日	ペムブロリズマブ200mg/body d1、パクリタキセル175mg/m2　d1、カルボプラチンAUC5　d1、アバスチン15mg/kg　d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		ルート確保											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
	☆	キイトルーダ点滴静注	200	mg/body		○							
		1日1回											
		0.2-5μmのインラインフィルターを使用											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	15分	○							
		デキサート注	19.8	mg		○							
		ファモチジン注	20	mg		○							
		1日1回											
		点滴開始時にレスタミンコーワ錠5錠内服											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
		グラニセトロン注	1	mg		○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	3時間	○							
	☆	パクリタキセル注	175	mg/㎡		○							
		1日1回											
		0.22μmフィルター使用											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		流し											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○							
	☆	カルボプラチン注	5	AUC		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		流し											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	90分	○							
	☆	アバスチン注	15	mg/kg		○							
		1日1回											
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可											
		それ以降、30分投与とすることができる											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		流し											
		休薬完了					●						
		以下別オーダ											
内服		レスタミンコーワ錠　10mg	5	錠	day1								
		1日1回　ﾃﾞｷｻｰﾄ・ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ点滴開始時											
内服		デカドロン錠	8	mg	day2・3								
		1日2回　朝昼食後											