

治療スケジュール

H-40

*レジメン名	TC+ペムブロリスマブ療法(21日間)(子宮頸)
*投与量・投与日	ペムブロリスマブ200mg/body d1、パクリタキセル 175mg/m ² d1、カルボプラチン AUC 5 d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		ルート確保							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○			
	☆	キイトルーダ点滴静注	200	mg/body		○			
		1日1回							
		0.2-5 μmのインラインフィルターを使用							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩水	100	mL	15分	○			
		デキサート注	19.8	mg		○			
		ファモチジン注	20	mg		○			
		1日1回							
		点滴開始時にレスタミンコーワ錠5錠内服							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩水	100	mL	30分	○			
		グラニセトロン	1	mg		○			
		1日1回							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩水	500	mL	3時間	○			
	☆	パクリタキセル	175	mg/m ²		○			
		1日1回							
		0.22 μmフィルター使用							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩水	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		流し							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩水	250	mL	1時間	○			
	☆	カルボプラチン	5	AUC		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩水	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		流し							
		休薬完了						●	
		以下別オーダー							
内服		レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	day1				
		1日1回 デキサート・ファモチジン点滴開始時							
内服		デカドロン錠	8	mg	day2・3				
		1日2回 朝昼食後							