治療スケジュール

I-3

*レジメン名	ゲムシタビン＋CBDCA療法(21日間)（尿路上皮）
*投与量・投与日	ゲムシタビン　1000mg/㎡　d1・8、　カルボプラチン　AUC=5　d1。デカドロン錠day2・3に8mg

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(21)	d(　)	d(　)
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○				
		パロノセトロン0.75mg	1	V		○				
		デキサート注	9.9	mg		○				
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○			
		デキサート注	6.6	mg			○			
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○			
	☆	ゲムシタビン	1000	mg/㎡		○	○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		5%ブドウ糖液	250	mL	1時間	○				
	☆	カルボプラチン	5	AUC		○				
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○			
		1日1回								
		流し								
		休薬完了						●		
		以下別オーダー								
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day2・3					
		1日2回　朝昼食後								