治療スケジュール

I-4

*レジメン名	ゲムシタビン＋CDDP療法（28日間）（膀胱）
*投与量・投与日	ゲムシタビン1000mg/㎡ d1、8、15　　CDDP70mg/㎡ d2

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d（1）	d（2）	d（3）	d（4）	d（8）	d（15）	d（28）	d（ ）
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○				○	○		
		デキサート注射液	6.6	mg		○				○	○		
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○				○	○		
	☆	ゲムシタビン注	1000	mg/㎡		○				○	○		
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○				○	○		
		1日1回											
持続点滴注射　メインルート		ソルデム1	500	mL	90分		○						
		1日1回											
持続点滴注射　メインルート		ソルデム1	500	mL	90分		○						
		1日1回											
持続点滴注射　メインルート		ソルデム1	500	mL	90分		○						
		1日1回											
持続点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	1時間		○						
		デキサート注射液	9.9	mg			○						
		パロノセトロン注0.75mg	1	V			○						
		1日1回											
		点滴開始時にアプレピタントカプセル125mg内服											
持続点滴注射　メインルート		20%マンニトール注	300	mL	30分		○						
		1日1回											
持続点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間		○						
	☆	シスプラチン注	70	mg/㎡			○						
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
持続点滴注射　メインルート		ソルデム1	500	mL	2時間		○						
		1日1回											
持続点滴注射　メインルート		ソルデム1	500	mL	3時間		○						
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		ソルデム3A	500	mL	3時間			○	○				
		1日1回											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分			○	○				
		デキサート注射液	6.6	mg				○	○				
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		ソルデム3A	500	mL	3時間			○	○				
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		ソルデム3A	500	mL	3時間			○	○				
		1日1回											
		休薬完了										●	
		以下別オーダー											
内服		アプレピタントカプセル	125	mg	day2								
		1日1回　4本目の点滴開始時											
内服		アプレピタントカプセル	80	mg	day3.4								
		1日1回　朝食後											