レジメン登録フォーマット

*レジメン名	BEP療法(21日間)(精巣)
*投与量・投与日	シスプラチン 20mg/㎡ d1-d5、エトポシド 100mg/㎡ d1-d5、ブレオマイシン 30mg/body d1,d8,d15

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(5)	d(6)	d(7)	d(8)	d(14)	d(15)	d(21)	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		ソルデム1輸液	500	mL	4時間	○	○	○	○	○										
		1日1回																		
通常点滴注射 メインルート		ソルデム1輸液	500	mL	4時間	○	○	○	○	○										
		1日1回																		
通常点滴注射 メインルート		ソルデム1輸液	500	mL	4時間	○	○	○	○	○										
		1日1回																		
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○														
		パロノセトロン静注0.75mg	1	V		○														
		デキサート注	9.9	mg		○														
		1日1回																		
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○	○	○	○										
		デキサート注	8	mg			○	○	○	○										
		1日1回																		
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							○		○					
		1日1回																		
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							○		○					
	☆	ブレオマイシン	30	mg/body		○							○		○					
		1日1回																		
		無菌製剤処理料1																		
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							○		○					
		1日1回																		
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○	○	○	○	○										
	☆	エトポシド	100	mg/㎡		○	○	○	○	○										
		1日1回																		
		無菌製剤処理料1																		
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○	○										
		1日1回																		
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○	;	○	○	○										
	☆	シスプラチン注	20	mg/㎡		○	○	○	○	○										
		1日1回																		
		無菌製剤処理料1																		
側管点滴注射 メインルート		マンニットール注	300	mL	1時間	○	○	○	○	○										
		1日1回																		
通常点滴注射 メインルート		ソルデム3A	500	mL	6時間						○	○								
		1日1回																		
通常点滴注射 メインルート		ソルデム3A	500	mL	6時間						○	○								
		1日1回																		
通常点滴注射 メインルート		ソルデム3A	500	mL	6時間						○	○								
		1日1回																		
通常点滴注射 メインルート		ソルデム3A	500	mL	6時間						○	○								
		1日1回																		
		休薬完了														●				
		以下別オーダー																		
内服		アピレピタントカプセル	125	mg	d1	○														
		1日1回 時間指定																		
内服		アピレピタントカプセル	80	mg	d2,3		○	○												
		1日1回 朝食後																		