治療スケジュール

J-4

*レジメン名	C-MOPP療法(28日間)(ホジキンリンパ腫)
*投与量・投与日	プロカルバジン内服 100mg/㎡ プレドニゾロン内服 40mg/㎡ d1～14 、 オンコビン 1.4mg/㎡ d1・8 、 エンドキサン 650mg/㎡ d1・8

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(14)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○				
		パロノセトロン静注0.75mg	1	V		○	○				
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○				
	☆	オンコビン注	1.4	mg/㎡		○	○				
		1日1回									
		オンコビン最大投与量 2mg/body									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○				
		1日1回									
		流し									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○	○				
	☆	エンドキサン注	650	mg/㎡		○	○				
		1日1回									
		無菌製剤処理料1(揮発性)									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○				
		1日1回									
		流し									
		休薬完了							●		
		以下別オーダー									
内服	☆	プロカルバジンカプセル(50mg)	100	mg/㎡	d1～d14						
		1日2回 朝夕食後									
内服	☆	プレドニン錠(5mg)	40	mg/㎡	d1～d14						
		1日2回 朝昼食後									