

治療スケジュール

J-5

*レジメン名	CHOP療法(21日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	ドキシソビシン 50mg/m ² d1 、 オンコビン 1.4mg/m ² d1 、 エンドキサン 750mg/m ² d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		パロノセトロン静注0.75mg	1	V		○			
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○			
	☆	ドキシソビシン注	50	mg/m ²		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	全開	○			
	☆	オンコビン注	1.4	mg/m ²		○			
		1日1回							
		オンコビン最大投与量 2mg/body							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		流し							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○			
	☆	エンドキサン注	750	mg/m ²		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1(揮発性)							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		流し							
		休薬完了						●	
		以下別オーダー							
内服	☆	プレドニン錠(5mg)	100	mg/body	day1-5				
		1日2回 朝昼食後							