

治療スケジュール

J-6

*レジメン名	R-CHOP(day1,2)療法(21日間)(悪性リンパ ^o)
*投与量・投与日	リツキシマブ 375mg/m ² d1、ドキシソルピシン50mg/m ² d2、オンコピン 1.4mg/m ² d2、エンドキサン 750mg/m ² d2

*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 1日1回	50	mL	15分	○				
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 ★リツキシマブBS注 1日1回 50→100→150mL/hで(30分毎50mL/h up) リツキシマブ1mg/mLに濃度調整 リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン服用 最大投与速度400mL/h 無菌製剤処理料1	375.5 375	mL/m ² mg/m ²	50→100→150mL/hで (30分毎50mL/h up)	○ ○				
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 1日1回 流し	50	mL	15分	○				
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 パロノセトロン静注0.75mg 1日1回	50 1	mL V	15分		○ ○			
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 ★ドキシソルピシン注 1日1回 無菌製剤処理料1	100 50	mL mg/m ²	30分		○ ○			
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 ★オンコピン注 1日1回 オンコピン最大投与量 2mg/body 無菌製剤処理料1	50 1.4	mL mg/m ²	全開		○ ○			
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 1日1回 流し	50	mL	15分		○			
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 ★エンドキサン注 1日1回 無菌製剤処理料1(揮発性)	500 750	mL mg/m ²	2時間		○ ○			
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 1日1回 休薬完了	50	mL	15分		○			●
以下別オーダー										
内服		カロナール錠(500mg) ポララミン錠(2mg) 1日1回 リツキシマブの30分前に	1 1	錠 錠	day1 day1					
内服	★	プレドニン錠(5mg) 1日2回 朝食後	100	mg/body	day2-6					