治療スケジュール

J-10

*レジメン名	R-CHOP（day1・5）療法（２１日間）悪性ﾘﾝﾊﾟ
*投与量・投与日	ドキソルビシン 50mg/㎡ d1 、 オンコビン 1.4mg/㎡ d1 、 エンドキサン 750mg/㎡ d1、 リツキシマブ 375mg/㎡ d5

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(5)	d(21)	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○			
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	337.5	mL/㎡	50→100→150mL/hで		○			
	☆	リツキシマブBS注	375	mg/㎡	(30分毎50mL/h up)		○			
		1日1回								
		50→100→150mL/hで(30分毎50mL/h up)								
		リツキシマブ1mg/mLに濃度調整								
		リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン服用								
		最大投与速度400mL/h								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○			
		1日1回								
		流し								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	開始速度20mL/h	○				
		1日1回								
		投与速度適宜調整し、流しにも使用								
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		パロノセトロン静注0.75mg	1	V		○				
		1日1回								
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○				
	☆	ドキソルビシン注	50	mg/㎡		○				
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	全開	○				
	☆	オンコビン注	1.4	mg/㎡		○				
		1日1回								
		オンコビン最大投与量 2mg/body								
		無菌製剤処理料1								
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○				
	☆	エンドキサン注	750	mg/㎡		○				
		1日1回								
		無菌製剤処理料1(揮発性)								
		休薬完了						●		
		以下別オーダー								
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day5					
内服		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day5					
		１日１回 リツキシマブ投与30分前								
内服	☆	プレドニン錠（5mg）	100	mg/body	day1-5					
		１日２回 朝昼食後								