治療スケジュール

J-105

*レジメン名	Isa-Kd療法（1コース目）（28日間）（MM） ※全角25文字
*投与量・投与日	ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ10mg/kg day1,8,15,22、ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ20mg/㎡ d1.2 ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ56mg/㎡ d8,9,15,16、ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ 20mg day2,9,16,23

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(8)	d(9)	d(15)	d(16)	d(22)	d(23)	d(28)	d()	d()	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○		○		○		○					
		ポララミン注	5	mg		○		○		○		○					
		ファモチジン注	20	mg		○		○		○		○					
		デキサート注	16.5	mg		○		○		○		○					
		1日1回															
		ｻｰｸﾘｻ投与30分前に投与															
		ｻｰｸﾘｻ投与30分前にｶﾛﾅｰﾙ服用															
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	175→225→275mg/hで	○		○		○		○					
	☆	サークリサ点滴静注	10	mg/kg	(30分毎50mg/h up)	○		○		○		○					
		175→225→275mg/hで(30分毎50mg/h up)															
		総量250mLに調製															
		最大投与速度400mg/h															
		0.2μm又は0.22μmのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用すること。															
		無菌製剤処理料1															
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○	○	○						
		1日1回															
側管点滴注射　メインルート		5%　ブドウ糖	100	mL	30分	○	○										
		注射用蒸留水 100ml	1	本	(ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ溶解用)	○	○										
	☆	カイプロリス点滴静注用	20	mg/㎡		○	○										
		1日1回															
		無菌製剤処理料1															
側管点滴注射　メインルート		5%　ブドウ糖	100	mL	30分			○	○	○	○						
		注射用蒸留水 100ml	1	本	(ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ溶解用)			○	○	○	○						
	☆	カイプロリス点滴静注用	56	mg/㎡				○	○	○	○						
		1日1回															
		無菌製剤処理料1															
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○	○	○	○					
		1日1回															
		流し															
		休薬完了												●			
		以下別オーダー															
内服		カロナール錠500mg	2	錠	day1,8,15,22	○		○		○		○					
		1日1回　サークリサ投与30分前に内服															
内服		レナデックス錠	20	mg	day2,9,16,23		○		○		○		○				
		1日1回　朝食後															