治療スケジュール

J-107

*レジメン名	Isa-Dex療法(1コース目)(28日間)(MM)	※全角25文字
*投与量・投与日	ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ20mg/kg day1,8,15,22、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 40mg day1,8,15,22	

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(22)	d(28)
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○	○	○	
		ポララミン注	5	mg		○	○	○	○	
		ファモチジン注	20	mg		○	○	○	○	
		デキサート注	33	mg		○	○	○	○	
		1日1回								
		ｻｰｸﾘｻ投与30分前に投与								
		ｻｰｸﾘｻ投与30分前にｶﾛﾅｰﾙ服用								
		75歳以上でﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ20mg/週に減量。								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	175→225→275mg/hで	○	○	○	○	
	☆	サークリサ点滴静注	20	mg/kg	(30分毎50mg/h up)	○	○	○	○	
		175→225→275mg/hで(30分毎50mg/h up)								
		総量250mLに調製								
		最大投与速度400mg/h								
		0.2μm又は0.22μmのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用すること。								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○	
		1日1回								
		流し								
		休薬完了								●
		以下別オーダー								
内服		カロナール錠500mg	2	錠	day1,8,15,22	○	○	○	○	
		１日１回　サークリサ投与30分前に内服								