レジメン登録フォーマット

J-109

*登録診療科	腫瘍・血液内科				
*申請医師	水谷　優				
*レジメン名	DBd療法(皮下)(1-3ｺｰｽ目)(21日間)(MM)	※全角25文字			
*疾患名	多発性骨髄腫	*適応患者		*適用区分	入院・外来
*投与量・投与日	ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ 1,800mg day1,8,15、ボルテゾミブ 1.3mg/㎡ day1,4,8,11、 デキサメタゾン 20mg day1,2,4,5,8,9,11,12				
コメント	ﾀﾞﾗｷｭｰﾛは、個人使用薬。内服(ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ、ｶﾛﾅｰﾙ・ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ)別処方。ﾀﾞﾗｷｭｰﾛは、ﾀﾞﾗﾂｽﾞﾏﾌﾞ量で表記。			※全角50文字	
最大投与(ｸｰﾙ)回数	なし	最大累積投与量			
*インターバル日数	21日間	*有効日付	2022.1		

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(4)	d(8)	d(11)	d(15)	d(16)	d(21)	d()
皮下注射	☆	ダラキューロ	1800	mg	3～5分	○		○		○			
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
		ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前にｶﾛﾅｰﾙ,ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ服用											
皮下注射	☆	ベルケイド	1.3	mg/㎡	数秒	○	○	○	○				
		生理食塩水20ml	1	A	(ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ溶解用)	○	○	○	○				
		1Vあたり生食1.2mLで溶解すること											
		無菌製剤処理料1											
		休薬完了										●	
		以下別オーダー											
内服	☆	レナデックス錠5mg　(ﾃﾞｷｻﾒﾀﾞｿﾞﾝ)	20	mg/day	day,12,4,5,8,9,11,12								
		1日1回朝食後											
		※75歳を超える、過少体重(BMI:18.5kg/㎡未満)、ｺﾝﾄﾛｰﾙ不良のDM又はｽﾃﾛｲﾄﾞ療法に対する忍容性がない、もしくは有害事象が発現した患者は省略可。											
		カロナール錠500mg	2	錠	day1,8,15								
		ポララミン錠2mg	1	錠	day1,8,15								
		1日1回ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前											