

治療スケジュール

J-11

*レジメン名	R-CHOP(d1)療法(IR有)(21日間)(悪性リンパ)
*投与量・投与日	リツキシマブ 375mg/m ² D1, ドキソルピシン 50mg/m ² D1, オンコピン1.4mg/m ² D1, エンドキサン750mg/m ² D1, プレドニン(5)20錠分2D1-5

*手技	癌	*薬品名**用法・コメント**休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射 別ルート		生理食塩液	500	ml	開始速度50ml/h	○			
		1日1回							
		投与速度適宜調整し、流しにも使用							
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	375	ml/m ²	50→100→150mL/hで	○			
	☆	リツキシマブBS注	375	mg/m ²	(30分毎50mL/h up)	○			
		1日1回							
		50→100→150mL/hで(30分毎50mL/h up)							
		リツキシマブ1mg/mLに濃度調整							
		リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポラミン服用							
		最大投与速度400mL/h							
		無菌製剤処理料1							
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	ml	30分	○			
		グラニセトロン静注液1mg	1	A		○			
		1日1回							
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	ml	30分	○			
	☆	ドキソルピシン	50	mg/m ²		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	ml	全開	○			
	☆	オンコピン	1.4	mg/m ²		○			
		1日1回							
		オンコピン最大投与量 2mg/body							
		無菌製剤処理料1							
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	ml	2時間	○			
	☆	エンドキサン	750	mg/m ²		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1(揮発性)							
		休薬完了					●		
		以下別オーダー							
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1				
		ポラミン錠(2mg)	1	錠	day1				
		1日1回 リツキシマブ投与30分前							
内服	☆	プレドニン錠(5mg)	100	mg/body	day1-5				
		1日2回 朝食後							