

治療スケジュール

J-114

*レジメン名	Pola-R-CHP療法(IR有)(2-6コース目)(21日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	リツキシマブ 375mg/m <sup>2</sup> d1, ドキソルビシン 50mg/m <sup>2</sup> d1, エンドキサン 750mg/m <sup>2</sup> d1, ポライビー 1.8mg/kg d2, プレドニン 100mg/day d1-5

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(21)	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	ml	15分	○	○		
		1日1回							
		流し							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	337.5	mL/m <sup>2</sup>	50→100→150mL/hで	○			
	☆	リツキシマブBS注	375	mg/m <sup>2</sup>	(30分毎50mL/h up)	○			
		1日1回							
		50→100→150mL/hで(30分毎50mL/h up)							
		リツキシマブ1mg/mLに濃度調整							
		リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン服用							
		最大投与速度400mL/h							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	ml	30分	○			
		パロノセトロン静注0.75mg	1	A		○			
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	ml	30分	○			
	☆	ドキソルビシン	50	mg/m <sup>2</sup>		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	ml	2時間	○			
	☆	エンドキサン	750	mg/m <sup>2</sup>		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1(揮発性)							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	ml	15分	○			
		1日1回							
		流し							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	90分		○		
		注射用蒸留水	20	ml			○		
	☆	ポライビー注	1.8	mg/kg			○		
		1日1回							
		体重42kg未満では、輸液を50mLに変更する。							
		忍容性が良好であれば、投与時間は30分まで短縮可。							
		0.2μmまたは0.22μmインラインフィルターを使用する。							
		ポライビー投与30分前にカロナール、ポララミン服用							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	ml	30分		○		
		1日1回							
		流し							
		休薬完了							●
		以下別オーダー							
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1				
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1				
		1日1回 リツキシマブ投与30分前							
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day2				
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day2				
		1日1回 ポライビー投与30分前							
内服	☆	プレドニン錠(5mg)	100	mg/body	day1-5				
		1日2回 朝食食後							