治療スケジュール

J-126

*レジメン名	G-CHOP療法(7,8ｺｰｽ目)(21日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	ｵﾋﾞﾇｽﾞﾏﾌﾞ 1000mg/body day1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()	d()	d()	d()	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
		デキサート	6.6	mg		○							
		1日1回											
		点滴開始時にｶﾛﾅｰﾙ・ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ内服											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	210	mL		○							
	☆	ガザイバ点滴静注	1000	mg/body		○							
		1日1回											
		生食250mLから40mL抜き、210mLとして使用											
		1コース目でGrade3以上のIR出現がなかった場合、25mL/hで開始可能、30分後 225mL/hまで上げることができる。 前回の投与でGrade 3以上のIR出現した場合は、12.5mL/hで開始し、30分毎に12.5mL/hずつ、最大100mL/hまで上げることができる。											
		0.2又は0.22μmフィルター使用											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	ml	15分	○							
		1日1回											
		休薬完了					●						
		以下別オーダー											
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1								
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1								
		1日1回 ガザイバ投与60分前											
内服		バクタ配合錠	1	錠	day1-21								
		1日1回 朝食後											