治療スケジュール

J-22

*レジメン名	ベンダムスチン+リツキシマブ療法(IR有)(28日間)悪性リンパ腫
*投与量・投与日	ベンダムスチン90mg/㎡ day1・2　リツキシマブ 375mg/㎡ day1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	開始速度20mL/h	○	○			
		1日1回								
		投与速度適宜調整し、流しにも使用								
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○				
		パロノセトロン静注 0.75mg	1	V		○				
		デキサート注射液	6.6	mg		○				
		1日1回								
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	ml	30分		○			
		デキサート注射液	6.6	mg			○			
		1日1回								
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○	○			
	☆	トレアキシン点滴静注液	90	mg/㎡		○	○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1(揮発性)								
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	337.5	ml/㎡	50→100→150mL/hで	○				
	☆	リツキシマブBS注	375	mg/㎡	(30分毎50mL/h up)	○				
		1日1回								
		50→100→150mL/hで(30分毎50mL/h up)								
		リツキシマブ1mg/mLに濃度調整								
		リツキシマブ投与30分前にカロナール,ポララミン服用								
		最大投与速度400mL/h								
		無菌製剤処理料1								
		休薬完了						●		
		以下別オーダー								
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1					
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1					
		1日1回　リツキシマブ投与30分前								
内服		アシクロビル錠(200mg)	1	錠	day1-28					
		1日1回 朝食後								
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day3・4					
		1日2回 朝昼食後								