治療スケジュール

J-29

*レジメン名	ｵﾋﾞﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ+B療法(2～6ｺｰｽ目)(28日間)(悪性ﾘﾝﾊﾟ腫)
*投与量・投与日	ガザイバ1000mg/body day1、ﾄﾚｱｷｼﾝ90mg/㎡ day1・2

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○				
		パロノセトロン静注 0.75mg	1	V		○				
		デキサート注射液	6.6	mg		○				
		1日1回								
		点滴開始時にｶﾛﾅｰﾙ・ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ内服								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○				
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○			
		デキサート注射液	6.6	mg			○			
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	210	mL	25mL/hで開始可能	○				
	☆	ガザイバ点滴静注	1000	mg/body		○				
		1日1回								
		生食250mLから40mL抜き、210mLとして使用								
		前回の投与でIRがgrade1以下の場合、医師の指示によって25mL/hで開始可能、30分毎25mL/h up、最大100mL/h								
		0.2又は0.22μmフィルター使用								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	30分	○				
		1日1回								
		点滴開始時トレアキシンの調製を薬剤部に依頼								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○	○			
	☆	トレアキシン点滴静注液	90	mg/㎡		○	○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1(揮発性)								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○			
		1日1回								
		休薬完了						●		
		以下別オーダー								
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1					
		ポラプラミン錠(2mg)	1	錠	day1					
		1日1回　ガザイバ投与30分前								
内服		アシクロビル錠(200mg)	1	錠	day1-28					
		1日1回 朝食後								
内服		バクタ配合錠	1	錠	day1-28					
		1日1回 朝食後								
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day3・4					
		1日2回 朝昼食後								