治療スケジュール

J-31

*レジメン名	DBd療法(1コース目day1～7)(21日間)(MM)
*投与量・投与日	ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ16mg/kg：day1、ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ1.3mg/㎡：day1・4、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ20mg/body：(div)day1、(po)day2・4・5

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(4)	d(7)	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液500mL	500	mL	開始時速度50mL/h	○						
		1日1回										
		投与速度適宜調整し、流しにも使用										
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液100mL	100	mL	60分	○						
		デキサート注射液	19.8	mg		○						
		1日1回										
		点滴開始時にカロナール、ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ内服										
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液1000mL	1000	mL	50→100→150→200mL/h	○						
	☆	ダラザレックス点滴静注	16	mg/kg		○						
		1日1回										
		総量1000mLに調製										
		50→100→150→200mL/hで										
		（1時間毎50mL/h up） 最大200mL/h										
		0.2又は0.22μmフィルター使用										
		無菌製剤処理料1										
皮下注射		生理食塩液20mL	1	A	(ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ溶解用)	○	○					
	☆	ベルケイド3mg	1.3	mg/㎡	数秒	○	○					
		1日1回										
		1Vあたり生食1.2mLで溶解										
		無菌製剤処理料1										
		休薬完了						●				
		以下別オーダー										
内服	☆	レナデックス錠(4mg)　（ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ）	20	mg/day	day2,4,5(※)							
		1日1回　朝食後										
		※75歳を超える、過少体重(BMI：18.5kg・㎡未満)、ｺﾝﾄﾛｰﾙ不良のDM又はｽﾃﾛｲﾄﾞ療法に対する忍容性がない、もしくは有害事象を発現した患者は省略可。										
内服		カロナール錠(500mg)	2	錠	day1							
		ポラプラミン錠（2mg）	1	錠	day1							
		1日1回 ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与60分前										
内服		ビクロックス錠(200mg)	1	錠	day1～7							
		1日1回 朝食後										
内服		バクタ配合錠	1	錠	day1～7							
		1日1回 朝食後										